Карелкина Е. В., Гончарова Н. С., Симакова М. А., Моисеева О. М.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА СЕЛЕКСИПАГ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Цель	Представить собственный опыт применения лекарственного препарата селексипаг на примере пациентов с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ), включенных в регистр ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» и принимавших участие в клинических исследованиях GRIPHON и GRIPHON OL.
Материал и методы	С 2010 г. в исследование включены 26 пациентов с ЛАГ: 20 – с идиопатической ЛАГ, 4 – с ЛАГ, ассоциированной с системной склеродермией, и 2 – с корригированными врожденными пороками сердца. На момент рандомизации 19 пациентов в течение не менее 1 мес получали терапию ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа. Среди пациентов, получавших селексипаг (n=14), 4 достигли высокой индивидуальной поддерживающей дозы (1200–1600 мкг 2 раза в сутки), 4 – средней дозы (600–1000 мкг 2 раза в сутки) и 6 пациентов – низкой дозы (200–400 мкг 2 раза в сутки).
Результаты	Отмечено положительное влияние терапии селексипагом на вторичные конечные точки, в частности, на динамику функционального класса легочной гипертензии, уровень NT-proBNP в сыворотке крови и физическую работоспособность пациентов. Нежелательные явления, связанные с приемом селексипага, которые стали причиной прекращения дальнейшего участия в исследовании, наблюдались у одного больного.
Заключение	Для достижения основной цели лекарственной терапии – низкого риска смерти – при назначении селексипага необходимо соблюдать режим титрации и стремиться к достижению максимально высокой индивидуальной поддерживающей дозы.
Ключевые слова	Легочная артериальная гипертензия; селексипаг; GRIPHON; комбинированная терапия
Для цитирования	Karelkina E. V., Goncharova N. S., Simakova M. A., Moiseeva O. M. Experience With Selexipag to Treat Pulmonary Arterial Hypertension. Kardiologiya. 2020;60(4):36–42. [Russian: Карелкина Е. В., Гончарова Н. С., Симакова М. А., Моисеева О. М. Опыт применения лекарственного препарата селексипаг в лечении пациентов с легочной артериальной гипертензией. Кардиология. 2020;60(4):36–42.]
Автор для переписки	Моисеева Ольга Михайловна. E-mail: moiseeva_om@almazovcentre.ru

Современная тактика комбинированной терапии успешно зарекомендовала себя в лечении широко спектра сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы доказательства эффективности последовательной и стартовой комбинированной терапии получены и в отношении больных с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ), что нашло отражение в рекомендациях Европейского общества кардиологов и Европейского респираторного общества от 2015 г. [1]. Основой подобного заключения стали результаты трех долгосрочных клинических исследований, в одном из которых, наряду со ставшей традиционной комбинацией ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ-5) и антагонистов эндотелиновых рецепторов (АЭР), оценивалась эффективность нового селективного агониста простаглицлиновых рецепторов [2–4].

Нарушение синтеза эндогенного простаглицлина рассматривается в качестве ключевого механизма развития ЛАГ [5]. Поэтому подтверждена эффективность синтетических аналогов простаглицлина (простаноиды) в лечении заболеваний этой группы [6]. Однако применение

этих препаратов ограничено не только коротким периодом полураспада (менее 5 мин для внутривенного эпопростенола, 20–30 мин для ингаляционного илопростра и 180–270 мин для подкожного трепростенила), но и возможными осложнениями, связанными с системой доставки действующего вещества. Кроме того, простаноиды, обладая высоким сродством к простаглицлиновым (IP) рецепторам, оказывают стимулирующее действие на про-станоеидные рецепторы желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы и периферических артерий большого круга кровообращения, вызывая диспепсические явления, боли в челюстях и конечностях, системную гипотензию и головную боль. В Российской Федерации из простаноидов зарегистрирован только ингаляционный препарат илопрост, применение которого в краткосрочном рандомизированном клиническом исследовании (РКИ) приводило к улучшению переносимости физической нагрузки и снижению функционального класса легочной гипертензии. Однако длительная монотерапия илопростом не сопровождалась повыше-

нием выживаемости больных с легочной гипертензией и снижением частоты развития осложнений, ассоциированных с ЛАГ. Поэтому в настоящее время илопрост применяется только в составе комбинированной ЛАГ-специфической терапии у пациентов III функционального класса (ФК) легочной гипертензии в дополнение к пероральным препаратам.

Поиск химически стабильного лекарственного препарата с пероральным путем доставки, избирательно воздействующего на IP-рецепторы, стал ключевым направлением дальнейших научных исследований, в результате которых появился первый и пока единственный непростоанодный селективный агонист IP-рецепторов – пероральный препарат селексиаг (Апбрави®), зарегистрированный в Российской Федерации 07 июня 2019 г.

Цель настоящего исследования: представить собственный опыт применения лекарственного препарата селексиаг на примере пациентов с ЛАГ, включенных в регистр ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» и принимавших участие в клинических исследованиях GRIPHON «Многоцентровое, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы с целью демонстрации эффективности и безопасности АСТ-293987 у пациентов с легочной артериальной гипертензией» и GRIPHON OL «Долгосрочное открытое исследование без контрольной группы для оценки безопасности и переносимости препарата селексиаг (АСТ-293987) у пациентов с легочной артериальной гипертензией».

Материал и методы

Для анализа использованы данные проспективного наблюдения 26 пациентов с ЛАГ, рандомизированных в клиническое исследование GRIPHON, проводимое на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» с 2010 г. и одобренное Центральным этическим комитетом Министерства здравоохранения Российской Федерации и локальным этическим комитетом ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова. Все пациенты, включенные в исследование, подписали информированное согласие. Клиническая характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Эхокардиографию выполняли на аппарате VIVID 7 Demension, оценка правых камер сердца проводилась в соответствии с рекомендациями по эхокардиографии от 2015 г. [7]. Гемодинамику оценивали в ходе катетеризации правых камер сердца с использованием термодилуционного баллонного катетера 7F Свана-Ганца путем измерения среднего давления в правом предсердии, систолического, диастолического и среднего давления в легочной артерии; давления заклинивания легочной артерии и сердечного выброса. Легочное сосудистое сопротивление, ударный объем и сердечный индекс рассчитывали по стандартным формулам. Всем пациентам

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с легочной артериальной гипертензией, включенных в исследование GRIPHON на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»

Показатель	Значение
Возраст, годы	48±15
Женский пол	72% (n=22)
III–IV ФК	81% (n=21)
Структура ЛАГ, %	
ИЛАГ	77
ССД	15
Корр.ВПС	8
Расстояние, пройденное в ТШХ, м	363±72
Эхокардиографические показатели	
Площадь ПП, см ²	26,3±9,2
ПЖ парастер. размер, мм	38±7
ПЖ:ЛЖ	1,19±0,34
Диаметр ЛА, мм	34±7
FAС, %	30±9
TAPSE, мм	18±4
TAS'V, м/с	9±2
Систолическое ДЛА, мм рт. ст.	88±24
Наличие выпота, %	15% (n=4)
Гемодинамические показатели	
Среднее ДЛА, мм рт. ст.	59±19
ДЗЛК, мм рт. ст.	8±4
ЦВД, мм рт. ст.	6,5 (3,0;10,0)
Сердечный индекс, л/мин/м ²	2,3±0,6
ЛСС, дин·с/см ⁻⁵	855 (531; 1440)
SvO ₂ , %	66±15
Дополнительные исследования	
NT-proBNP, пг/мл	517 (175; 2271)
ОФВ ₁ , %	88±24
ОЕЛ, %	97±12
DLco, %	57±15

ИЛАГ – идиопатическая легочная артериальная гипертензия, ССД – системная склеродермия, корр.ВПС – корригированный врожденный порок сердца; ФК – функциональный класс; ТШХ – тест с 6-минутной ходьбой; ПП – правое предсердие; ПЖ – правый желудочек; ПЖ/ЛЖ – отношение базальных размеров правого и левого желудочков; TAPSE – амплитуда движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана; TAS'V – скорость движения латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана; FAС – процент изменения площади ПЖ в одном сердечном цикле; ДЛА – давление в легочной артерии; ДЗЛК – давление заклинивания легочных капилляров; ЦВД – центральное венозное давление; СИ – сердечный индекс; ЛСС – легочное сосудистое сопротивление; SvO₂ – насыщение кислородом смешанной венозной крови, NT-proBNP – N-концевой натрийуретический пропептид; ОФВ₁ – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; ОЕЛ – общая емкость легких; DLco – диффузионная способность легких. Данные представлены в виде среднего арифметического значения (М) ± среднеквадратичного отклонения (σ) или медианы (25-й перцентиль; 75-й перцентиль) распределения.

выполняли комплексное исследование функции внешнего дыхания (спирометрия и бодиплетизмография) с определением стандартных и динамических показателей вентилиции и статических объемов легких на ап-

парате VIASYS Healthcare Hoechberg. Диффузионную способность легких (Dlco) оценивали с помощью двуокиси углерода методом одиночного вдоха с задержкой дыхания и коррекцией на уровень гемоглобина. Dlco выражали в процентах от должной величины. Уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пропептида (NT-proBNP) в сыворотке крови определяли в центральной лаборатории в рамках клинического исследования.

Статистический анализ данных, полученных в ходе исследования, проведен с использованием прикладных статистических программ Statistica for Windows ver. 10.0. Для показателей, имеющих приблизительно нормальное распределение, результаты представлены в виде среднего арифметического значения (M), среднеквадратичного отклонения (σ) и количества признаков в группе (n), в остальных случаях – в виде медианы и процентилей. Критерий значимости устанавливали на уровне $p < 0,05$. Для выявления независимого влияния на количественные показатели качественных факторов была использована процедура однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA), для показателей с распределением, отличным от нормального, – непараметрический критерий U Манна–Уитни. Выживаемость пациентов рассчитывали с использованием метода Каплана–Мейера.

Результаты

В соответствии с дизайном клинического исследования из регистра Центра отобрано 20 пациентов с идиопатической ЛАГ и 6 больных с ЛАГ, ассоциированной с системной склеродермией ($n=4$) и скорректированными врожденными пороками сердца ($n=2$). Среди включенных в исследование 5 больных имели II ФК, 19 – III ФК и 2 – IV ФК ЛАГ. На момент рандомизации 19 пациентов в течение не менее 1 мес получали терапию ИФДЭ-5 (12 – силденафил, 7 – тадалафил). После скринингового обследования пациентов рандомизированно распределяли в соотношении 1:1 в группу, получающую исследуемый препарат селексиага, или в группу плацебо. В дальнейшем в течение 12-недельного периода дозу селексиага титровали, начиная с 200 мкг 2 раза в сутки, еженедельно повышая дозу на 200 мкг до максимально переносимой. Максимально допустимая доза селексиага составляла 1600 мкг 2 раза в сутки. Среди пациентов, получавших исследуемый препарат ($n=14$), только 4 достигли высокой индивидуальной поддерживающей дозы (1200–1600 мкг 2 раза в сутки), 4 – средней (600–1000 мкг 2 раза в сутки) и 6 – низкой (200–400 мкг 2 раза в сутки). Таким образом, медиана индивидуальной поддерживающей дозы селексиага в нашем Центре не превышала 700 мкг (200; 1400) 2 раза в сутки, что принципиально отличалось от структуры поддерживающей дозы в исследовании в целом

($n=1156$, среди них 574 – группа селексиага), в котором 42,9% получали высокие дозы, 31,2% – средние и только 23,2% – низкие дозы.

Двойной слепой период исследования GRIPHON был завершен после достижения 331 исхода. В качестве комбинированной первичной конечной точки было выбрано время до первого осложнения, ассоциированного с ЛАГ, или смерти пациента. В качестве вторичных конечных точек оценивали изменения расстояния, пройденного в тесте с 6-минутной ходьбой (ТШХ), ФК ЛАГ (ВОЗ), уровня NT-proBNP в сыворотке крови, а также госпитализации в связи с утяжелением ЛАГ и смерть больного вследствие ЛАГ или любой другой причины до конца исследования. Как наглядно демонстрируют результаты клинического исследования GRIPHON [4], применение селексиага увеличивало время до наступления первого исхода на 40% (относительный риск – ОР 0,60 при 99% доверительном интервале – ДИ от 0,46 до 0,78; $p < 0,001$). Следует отметить, что эффективность селексиага не зависела от того, применялся ли препарат в качестве монотерапии (ОР 0,57 при 99% ДИ от 0,32 до 1,03) или в комбинации с другими ЛАГ-специфическими препаратами: ИФДЭ-5 (ОР 0,66 при 99% ДИ от 0,32 до 1,35) или АЭР (ОР 0,66 при 99% ДИ от 0,32 до 1,35). Не выявлена зависимость эффективности препарата от возраста пациента и этиологии заболевания [8, 9].

Сходные тенденции при анализе первичной конечной точки отмечены в нашем центре ($p=0,098$; рис. 1). Отсутствие достоверных различий можно объяснить небольшим объемом анализируемой выборки и более низким процентом больных, получавших высокие индивидуальные поддерживающие дозы.

Рисунок 1. Время наступления оцениваемого исхода в группах приема селексиага и плацебо

Лог-ранговый тест 2, 83; $p=0,098$.

Первый и единственный пероральный селективный агонист IP-рецепторов простаглицлина¹

БУДЬ ВПЕРЕДИ

На **64%** снижает риск прогрессирования заболевания/смерти у пациентов с ЛАГ на ранней стадии в тройной комбинированной терапии³

На **40%** снижает риск прогрессирования заболевания/смерти у всех пациентов с ЛАГ независимо от линии терапии²

Апбрави
селексипаг

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ АПБРАВИ⁴

Регистрационный номер: ЛП-005577. Торговое наименование: Апбрави. Международное непатентованное наименование: селексипаг. Лекарственная форма: таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Показания: Апбрави показан для длительного лечения лёгочной артериальной гипертензии у взрослых пациентов (ЛАГ, группа I по классификации ВОЗ) I-II-V ФК по классификации ВОЗ, с целью предотвращения прогрессирования заболевания. Апбрави эффективен в комбинации с АРЭ и/или ИФДЭ-5, или в составе тройной терапии с АРЭ и ИФДЭ-5, или в монотерапии. Эффективность Апбрави доказана в отношении идиопатической и наследственной ЛАГ, ЛАГ, ассоциированной с заболеваниями соединительной ткани, ЛАГ, ассоциированной с компенсированным простым врождённым пороком сердца. Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему и вспомогательным веществам; тяжёлая ишемическая болезнь сердца или нестабильная стенокардия; инфаркт миокарда, перенесённый в течение предшествующих 6 месяцев; декомпенсированная сердечная недостаточность при отсутствии пристального наблюдения врача; тяжёлые нарушения сердечного ритма; цереброваскулярные заболевания (например, преходящее нарушение мозгового кровообращения, инсульт), перенесённые в течение предшествующих 3 месяцев; врождённые или приобретённые пороки сердца с клинически значимыми нарушениями функции миокарда, не связанными с ЛАГ; совместное применение с мощными ингибиторами CYP2C8 (например, гемфиброзилом); беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены). С осторожностью: у пациентов с артериальной гипотензией, у пациентов с веноокклюзионной болезнью лёгких, при совместном применении с умеренными ингибиторами изофермента CYP2C8 (например, клопидогрелем, деферазироксом, терифлуномидом), у пациентов старше 75 лет (ограниченный опыт применения), у пациентов с нарушением функции печени тяжёлой степени (класс C по классификации Чайлд-Пью), у пациентов с нарушением функции почек тяжёлой степени (рСКФ < 30 мл/мин/1,73 м²), у пациентов с гипертиреозом и у женщин детородного возраста. Способ применения и дозы: Апбрави применяют внутрь 2 раза в сутки (утром и вечером), запивая необходимым количеством воды. Титрование дозы. Для каждого пациента с помощью титрования дозы должна быть подобрана индивидуальная максимальная переносимая доза, в диапазоне от 200 мкг 2 раза в день до 1600 мкг 2 раза в день (индивидуальная поддерживающая доза). Рекомендуемая начальная доза - 200 мкг 2 раза в день с интервалом примерно 12 ч между приёмами. Дозу увеличивают с шагом 200 мкг 2 раза в день, обычно с периодичностью 1 раз в неделю. В начале терапии и в начале каждого этапа повышения дозы рекомендуется принимать первую дозу вечером. Побочное действие: наиболее часто отмечавшимися нежелательными реакциями являются головная боль, диарея, тошнота, рвота, боль в челюсти, боль в конечностях, артралгия, приливы крови к лицу и верхней половине тела. Данные реакции наиболее часто наблюдаются во время титрования дозы.

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА.

Сокращения: АРЭ - антагонисты рецепторов эндотелина, ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения, ИФДЭ-5 - ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, ЛАГ - лёгочная артериальная гипертензия, ФК - функциональный класс.

Литература: 1. Noel ZR et al. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial hypertension. *Am J Health-Syst Pharm.* 2017; 74:1135-41. 2. Sitbon O, Channick R, Chin KM, et al; for the GRIPHON Investigators. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial hypertension. *N Eng J Med.* 2015;373(26):2522-2533. 3. Coghlan JG, Channick R, Chin K, et al. Targeting the prostacyclin pathway with selexipag in patients with pulmonary arterial hypertension receiving double combination therapy: insights from the randomized controlled GRIPHON study. *Am J Cardiovasc Drugs.* 2018;18(1):37-47. 4. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Апбрави. Регистрационный номер ЛП-005577.

Рисунок 2. Динамика ФК легочной гипертензии (А) и уровня NT-proBNP в сыворотке крови (Б) у больных с ЛАГ на момент завершения двойного слепого периода ($p>0,05$)

ФК – функциональный класс; NT-proBNP – N-концевой натрийуретический пропептид; ЛАГ – легочная артериальная гипертензия.

Рисунок 3. Изменение расстояния, пройденного при ТШХ, в группе плацебо и селексипага (критерий U Манна–Уитни; $p=0,029$)

ТШХ – тест с 6-минутной ходьбой;
ЛАГ – легочная артериальная гипертензия.

Наряду с этим отмечено положительное влияние терапии селексипагом на вторичные конечные точки, в частности, на динамику ФК легочной гипертензии, уровень NT-proBNP в сыворотке крови (рис. 2) и физическую работоспособность пациентов (рис. 3).

Нежелательные явления, связанные с приемом селексипага, в 14,3% случаев по сравнению с 7,1% ($p<0,001$) в группе плацебо были причиной прекращения дальнейшего участия в исследовании GRIPHON. В нашем центре в связи с развитием побочных явлений прекратил участие

Таблица 2. НЯ, ассоциированные с применением селексипага, зарегистрированные в центре

Параметр	Плацебо (n=12)	Селексипаг (n=14)	P
≥1 НЯ, связанного с приемом исследуемого препарата	6 (50)	12 (85,7)	0,046
НЯ, абс. (%)			
Головная боль	3 (25)	10 (71,4)	0,016
Диарея	1 (8,3)	7 (50)	0,016
Боли в челюсти	2 (16,7)	6 (42,9)	0,14
Покраснение лица	0	3 (21,4)	0,044
Миалгии	0	2 (9,4)	0,11
Мышечная слабость	2 (16)	0	0,070
Головокружение	0	1 (10,4)	0,26
Тиреотоксикоз	0	1 (10,4)	0,26

НЯ – нежелательные явления.

в исследовании 1 (3,8%) пациент. Наиболее частыми нежелательными явлениями, связанными с приемом агониста IP-рецепторов, были головная боль, диарея, боль в челюсти и покраснение лица (табл. 2). Следует отметить, что побочные явления чаще регистрировались в процессе титрации препарата, что во многом ограничивало достижение максимальной поддерживающей дозы. Гипертиреоз, связанный с увеличением синтеза гормонов в фолликулярных клетках щитовидной железы за счет гиперпродукции циклического аденозинмонофосфата на фоне повышения концентрации простагличина [10], крайне редко регистрируется при приеме селексипага (1,4%), но в нашем центре он стал причиной прекращения приема препарата. Полученные данные подчеркивают важность аккуратной титрации препарата, направленной на минимизацию побочных эффектов и достижение максимально переносимой дозы препарата.

Обсуждение

Селексипаг представляет собой пролекарство, которое гидролизуется в печени с образованием активного метаболита MRE-269, обладающего свойствами высоко-селективного агониста IP-рецепторов. При проведении исследований на модели монокроталиновой легочной гипертензии препарат продемонстрировал способность улучшать функциональное состояние эндотелия сосудов легких, сдерживать гипертрофию/гиперплазию гладкомышечных клеток средней оболочки сосудов и гипертрофию правого желудочка, что в итоге сопровождалось улучшением выживаемости экспериментальных животных [11]. Благодаря высокой функциональной селективности, селексипаг и его метаболит не оказывали стимулирующее действие на гладкие мышцы желудка, что позволило минимизировать такие характерные для простаноидов побочные эффекты, как тошнота и рвота. Фармакокинетика селексипага и его активного метаболита пропорциональна дозе. Их максимальная концентрация достигается через 2,5 и 4 ч соответственно, тогда как стабильности концентрации удастся добиться только через 3 дня. Данный факт подчеркивает важность медленной титрации препарата, за счет которой снижается риск развития побочных эффектов. Селексипаг безопасен в комбинации с ингибиторами органических анионотранспортных полипептидов, р-гликопротеинов и СYP3A4, что расширяет возможности применения препарата у больных с лекарственной и ассоциированной ЛАГ. В рамках II фазы РКИ (n=43) применение селексипага сопровождалось не только снижением легочного сосудистого сопротивления на 30,3%, но также оказывало положительное влияние на физическую работоспособность пациентов (ТШХ +24,2 м при 95% ДИ от 23,7 до 72,2 м) и основные гемодинамические показатели, определяющие неблагоприятный прогноз заболевания: сердечный индекс +0,5 (0,13–0,83) л/мин/м² (p=0,01) и давление в правом предсердии –3,2 (0,8–5,7) мм рт. ст. (p=0,02) [12].

С учетом ряда ограничений, связанных с использованием ТШХ в качестве основного показателя оценки результатов ранее проводимых РКИ, в середине 2000-х годов было предложено использовать в новых регистрационных исследованиях, посвященных оценке эффективности ЛАГ-специфической терапии, комбинированные конечные точки, отражающие время до наступления клинического ухудшения [13]. Подобный подход применен при проведении РКИ GRIPHON, что позволило не только подтвердить эффективность селексипага в сдерживании прогрессирования заболевания, но и впервые продемонстрировать преимущества трехкомпонентной комбинированной терапии с использованием селексипага по сравнению с ранее проводимой двухкомпонентной терапией ИФДЭ-5 и АЭР: снижение риска

на 37% (ОР 0,63 при 95% ДИ от 0,44 до 0,90). Причем эффективность трехкомпонентной пероральной комбинированной терапии у пациентов со II ФК была выше, чем с III ФК (ВОЗ): на 64% (ОР 0,36 при 95% ДИ от 0,14 до 0,91) и 26% (ОР 0,74 при 95% ДИ от 0,50 до 1,10) соответственно [14]. Если учесть, что годовая летальность пациентов II и III ФК, исходно стратифицированных как промежуточный риск, составляет 17%, то переход в зону низкого риска на фоне терапии практически нивелирует различия по выживаемости этих пациентов с пациентами, исходно стратифицированными в зону низкого риска смерти [15].

В последние годы в качестве альтернативы эскалации ЛАГ-специфической терапии за счет добавления второго и третьего препарата обсуждается тактика замены препарата одной группы лекарственным средством из другой группы. В этой связи перспективными для дальнейшей оценки представляются единичные наблюдения успешного перевода пациентов, находящихся в стабильном состоянии, с терапии простаноидами на пероральный прием селексипага [16].

Современная тактика лечения больных ЛАГ направлена на достижение статуса низкого риска смерти, который подразумевает низкий ФК ЛАГ (I–II), хорошую толерантность к физической нагрузке (расстояние, пройденное при ТШХ, >440 м), благоприятный профиль гемодинамики по данным катетеризации правых камер сердца (давление в правом предсердии <8 мм рт. ст., сердечный индекс $\geq 2,5$ л/мин/м²), низкий уровень NT-proBNP (<330 нг/л) и отсутствие признаков дисфункции правого желудочка. Согласно теории формирования ЛАГ, одновременное воздействие на различные пути патогенеза может не только предотвратить прогрессирование заболевания, но и позволит более эффективно влиять на его исходы. Подтверждением действенности подобной тактики служат результаты мета-анализа 15 РКИ (n=3 906), в которых показано снижение риска прогрессирования ЛАГ на 38% (ОР 0,62 при 95% ДИ от 0,50 до 0,77), улучшение гемодинамических показателей и физической работоспособности пациентов (ТШХ +23 м при 95% ДИ от 15,9 до 30,1 м) на фоне комбинированной терапии по сравнению с монотерапией [17]. На основании проведенных РКИ сделан вывод о целесообразности ранней комбинированной ЛАГ-специфической терапии даже у пациентов с II ФК ЛАГ, которых можно отнести к зоне как низкого, так и промежуточного риска смерти. В 2018 г. Кельнский консенсус экспертов ЛАГ и 6-й Всемирный симпозиум по легочной гипертензии предложили новый подход в назначении стартовой комбинированной терапии, согласно которому даже пациентам с низким риском смерти показана стартовая комбинированная терапия для стабильного достижения зоны низ-

кого риска [18, 19]. Вместе с тем большинство больных ЛАГ продолжают получать монотерапию, что и определяет по-прежнему низкую трехлетнюю выживаемость пациентов I группы легочной гипертензии, варьирующую от 67 до 74% [15, 20].

Заключение

Следует подчеркнуть важность результатов исследования GRIPHON для клинической практики, наглядно продемонстрировавших эффективность селексипага не только для улучшения физической работоспособности пациентов, но прежде всего для предупреждения

прогрессирования ЛАГ в рамках как моно-, так и двух- и трехкомпонентной комбинированной терапии независимо от возраста пациента, этиологии и функционального класса ЛАГ. Для достижения основной цели лекарственной терапии – низкого риска смерти – при назначении селексипага необходимо соблюдать режим титрации и стремиться к достижению максимально высокой индивидуальной поддерживающей дозы.

Конфликт интересов авторами не заявлен.

Статья поступила 24.01.20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Galiè N, Humbert M, Vachiery J-L, Gibbs S, Lang I, Torbicki A et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *European Heart Journal*. 2016;37(1):67–119. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv317
- Galiè N, Barberà JA, Frost AE, Ghofrani H-A, Hoeper MM, McLaughlin VV et al. Initial Use of Ambrisentan plus Tadalafil in Pulmonary Arterial Hypertension. *New England Journal of Medicine*. 2015;373(9):834–44. DOI: 10.1056/NEJMoa1413687
- Pulido T, Adzerikho I, Channick RN, Delcroix M, Galiè N, Ghofrani H-A et al. Macitentan and Morbidity and Mortality in Pulmonary Arterial Hypertension. *New England Journal of Medicine*. 2013;369(9):809–18. DOI: 10.1056/NEJMoa1213917
- Sitbon O, Channick R, Chin KM, Frey A, Gaine S, Galiè N et al. Selexipag for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. *New England Journal of Medicine*. 2015;373(26):2522–33. DOI: 10.1056/NEJMoa1503184
- Humbert M, Ghofrani H-A. The molecular targets of approved treatments for pulmonary arterial hypertension. *Thorax*. 2016;71(1):73–83. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2015-207170
- Mubarak KK. A review of prostaglandin analogs in the management of patients with pulmonary arterial hypertension. *Respiratory Medicine*. 2010;104(1):9–21. DOI: 10.1016/j.rmed.2009.07.015
- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. *European Heart Journal – Cardiovascular Imaging*. 2015;16(3):233–71. DOI: 10.1093/ehjci/jev014
- Gaine S, Chin K, Coghlan G, Channick R, Di Scala L, Galiè N et al. Selexipag for the treatment of connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension. *European Respiratory Journal*. 2017;50(2):1602493. DOI: 10.1183/13993003.02493-2016
- Beghetti M, Channick RN, Chin KM, Di Scala L, Gaine S, Ghofrani H et al. Selexipag treatment for pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease after defect correction: insights from the randomised controlled GRIPHON study. *European Journal of Heart Failure*. 2019;21(3):352–9. DOI: 10.1002/ehf.1375
- Satoh M, Aso K, Nakayama T, Saji T. Effect of treatment with epoprostenol and endothelin receptor antagonists on the development of thyrotoxicosis in patients with pulmonary arterial hypertension. *Endocrine Journal*. 2017;64(12):1173–80. DOI: 10.1507/endocrj.EJ17-0155
- Baker WL, Darsaklis K, Singhvi A, Salerno EL. Selexipag, an Oral Prostacyclin-Receptor Agonist for Pulmonary Arterial Hypertension. *Annals of Pharmacotherapy*. 2017;51(6):488–95. DOI: 10.1177/1060028017697424
- Simonneau G, Torbicki A, Hoeper MM, Delcroix M, Karłóca K, Galiè N et al. Selexipag: an oral, selective prostacyclin receptor agonist for the treatment of pulmonary arterial hypertension. *European Respiratory Journal*. 2012;40(4):874–80. DOI: 10.1183/09031936.00137511
- Sitbon O, Gombert-Maitland M, Granton J, Lewis MI, Mathai SC, Rainisio M et al. Clinical trial design and new therapies for pulmonary arterial hypertension. *European Respiratory Journal*. 2019;53(1):1801908. DOI: 10.1183/13993003.01908-2018
- Coghlan JG, Channick R, Chin K, Di Scala L, Galiè N, Ghofrani H-A et al. Targeting the Prostacyclin Pathway with Selexipag in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension Receiving Double Combination Therapy: Insights from the Randomized Controlled GRIPHON Study. *American Journal of Cardiovascular Drugs*. 2018;18(1):37–47. DOI: 10.1007/s40256-017-0262-z
- Kyllhammar D, Kjellström B, Hjalmarsson C, Jansson K, Nisell M, Söderberg S et al. A comprehensive risk stratification at early follow-up determines prognosis in pulmonary arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2018;39(47):4175–81. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx257
- Frost A, Janmohamed M, Fritz JS, McConnell JW, Poch D, Fortin TA et al. Safety and tolerability of transition from inhaled treprostinil to oral selexipag in pulmonary arterial hypertension: Results from the TRANSIT-1 study. *The Journal of Heart and Lung Transplantation*. 2019;38(1):43–50. DOI: 10.1016/j.healun.2018.09.003
- Fox BD, Shtraichman O, Langleben D, Shimony A, Kramer MR. Combination Therapy for Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. *Canadian Journal of Cardiology*. 2016;32(12):1520–30. DOI: 10.1016/j.cjca.2016.03.004
- Hoeper MM, Apitz C, Grünig E, Halank M, Ewert R, Kaemmerer H et al. Targeted therapy of pulmonary arterial hypertension: Updated recommendations from the Cologne Consensus Conference 2018. *International Journal of Cardiology*. 2018;272S:37–45. DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.08.082
- Galiè N, Channick RN, Frantz RP, Grünig E, Jing ZC, Moiseeva O et al. Risk stratification and medical therapy of pulmonary arterial hypertension. *European Respiratory Journal*. 2019;53(1):1801889. DOI: 10.1183/13993003.01889-2018
- Hoeper MM, Kramer T, Pan Z, Eichstaedt CA, Spiesshoefer J, Benjamin N et al. Mortality in pulmonary arterial hypertension: prediction by the 2015 European pulmonary hypertension guidelines risk stratification model. *European Respiratory Journal*. 2017;50(2):1700740. DOI: 10.1183/13993003.00740-2017